赤腹蜂属和盾斑蜂属在我国的两种新记录

TWO NEW RECORDS OF *PAREVASPIS ABDOMINALIS* SMITH AND *CROCISA HISTRIO* FABR. FROM CHINA (APOIDEA, HYMENOPTERA)

1.红腹赤腹蜂 *Parevaspis abdominalis* Smith。

据 Bingham (1879) 记载,本种分布于印度、缅甸、锡兰、马来亚及日本等地。于 1973. V. 18. 在云南扬武采到3♂♂, 1973. VI. 9. 在云南临沧采到1♂及云南西双版纳佛海 (1957. VIII. 15, 1♀) 的标本均符合 Smith., Dall., 和 Bingham 的描述,唯体型较小,♀体长 6.5 毫米,♂体长 4.8—7.3 毫米,代表了本种在我国的首次记录。

2.伊斯的利亚盾斑蜂 *Crocisa histrio* Fabr.

本种广泛分布于欧洲、非洲及亚洲。于 1973.V. 27 在云南西双版纳橄榄坝采到2♀♀, 1♂, 云南小勐养2♀♀(1957. X. 10) 标本,符合 Fabr. Dall, Binghan 的描述,代表了本种在我国的首次记录。胡经甫记录了中国盾斑蜂属的 18 个种和一个亚种。本种是该属在我国的另一个种的新记录。

本工作是 1974 年作者在中国科学院昆明动物研究所工作期间完成,标本现存放云南昆明中国科学院动物研究所。

王 容 玉

(山东省德州医学专科学校)